

Кому и когда лечить гепатит С:



Лечить срочно:

- + при выраженном фиброзе (F3) или циррозе (F4), включая декомпенсированный цирроз
- + при гепатите С и ВИЧ
- + при гепатите С и гепатите В
- + в случае, если предписана пересадка печени
- + в случае рецидива гепатита С после пересадки печени
- + в случае клинически значимых внепеченочных проявлений
- + людям, подверженным риску передачи гепатита С другим (люди, употребляющие инъекционные наркотики; женщины детородного возраста, планирующие забеременеть; пациенты, получающие процедуру гемодиализа; люди, находящиеся в местах лишения свободы; люди, склонные к рискованным сексуальным практикам).


Лечить нужно:

при умеренном фиброзе (F2)



Лечение может быть отложено:

При отсутствии или при легкой форме фиброза (F0 – F1) и без наличия внепеченочных проявлений, указанных выше.



Что из лечения доступно в РФ (2015):

Стандартные интерфероны («Роферон-А», «Инtron А», «Лаферон», «Реаферон ЕС», «Реальдирон», «Эберон», «Интераль», «Альтевир», «Альфаарона» и другие) и рибавирин (RBV) для генотипов 2 и 3, молодой возраст (до 40 лет), отсутствие выраженного фиброза/цирроза печени, отсутствие сопутствующих заболеваний. Курс лечения 24-48 недель.

Пегилированные интерфероны (PegIFN-α) («Пегасис»; «ПегИнtron»; «ПегАльтевир»; «Альгерон») + рибавирин (RBV) для генотипов с 2 по 6, курс лечения 24-48 недель. Для 1 генотипа желательна терапия с противовирусными препаратами (ПППД).

Противовирусные препараты прямого действия (ПППД) с пегилированными интерферонами (PegIFN-α) и рибавирином (RBV):
 + телапревир («Инсиво») курс 12 недель для 1 генотипа;
 + боцепревир («Виктрелис») курс 24-44 недели для 1 генотипа;
 + симепревир («Совриад») курс 12 недель для 1 генотипа
 Курс лечения ПППД + пегилированные интерфероны (PegIFN-α) + рибавирин (RBV): от 24 до 48 недель

Комбинированный препарат омбитасвир, дасабувир и паритапревир/ритонавир («Викейра Пак») с рибавирином (RBV) или без рибавирина (RBV). Курс 12-24 недели для 1 и 4 генотипов.



Что из лечения гепатита С есть в мире на 2015 и что нас ждет в РФ:

- + СОФОСБУВИР + рибавирин – курс 12-24 недели
 - + ДАКЛАТАСВИР + СОФОСБУВИР – курс 12-24 недели
 - + СОФОСБУВИР + ЛЕДИПАСВИР – 1 таблетка в день, курс 12-24 недели
- Рекомендуемые схемы лечения смотри в таблице 1.

Что делать, если лечение гепатита С требуется сейчас:



- ГЕНЕРИКИ (Индия, Китай, Египет, Непал, Марокко и др.)
 Средняя цена курса лечения генерическими препаратами:
 + софосбувир + рибавирин – от \$1000
 + софосбувир + пегилированные интерфероны + рибавирин от \$1785

таблица 1. Рекомендуемые схемы лечения гепатита С, доступные в мире (EASL 2015):

Генотип ВГС	PegIFN-α, RBV, софосбувир	PegIFN-α, RBV, симепревир	Софосбувир и RBV	Софосбувир и ледипасвир	Паритапревир, бустированный ритонавиром, омбитасвир и дасабувир	Паритапревир, бустированный ритонавиром, и омбитасвир	Софосбувир и симепревир	Софосбувир и даклатасвир
1a	12 недель	12 недель, затем PegIFN-α и RBV 12 недель (для naïвных пациентов или с рецидивом) или 36 недель (в случаях нулевого или частичного вирусологического ответа)	Не рекомендуется	8-12 недель без RBV	12 недель с RBV	Не рекомендуется	12 недель без RBV	12 недель без RBV
1b					12 недель без RBV			
2	12 недель	Не рекомендуется	12 недель	Не рекомендуется	Не рекомендуется	Не рекомендуется	Не рекомендуется	12 недель без RBV
3	12 недель	Не рекомендуется	24 недели	Не рекомендуется	Не рекомендуется	Не рекомендуется	Не рекомендуется	12 недель без RBV
4	12 недель	12 недель, затем PegIFN-α и RBV 12 недель (для naïвных пациентов или с рецидивом) или 36 недель (в случаях нулевого или частичного вирусологического ответа)	Не рекомендуется	12 недель без RBV	Не рекомендуется	12 недель с RBV	12 недель без RBV	12 недель без RBV
5 или 6	12 недель	Не рекомендуется	Не рекомендуется	12 недель без RBV	Не рекомендуется	Не рекомендуется	Не рекомендуется	12 недель без RBV