

Кому и когда лечить гепатит С:



Лечить срочно:

- ✚ при выраженном фиброзе (F3) или циррозе (F4), включая декомпенсированный цирроз
- ✚ при гепатите С и ВИЧ
- ✚ при гепатите С и гепатите В
- ✚ в случае, если предписана пересадка печени

✚ в случае рецидива гепатита С после пересадки печени


✚ в случае клинически значимых внепеченочных проявлений

✚ людям, подверженным риску передачи гепатита С другим (люди, употребляющие инъекционные наркотики; женщины детородного возраста, планирующие забеременеть; пациенты, получающие процедуру гемодиализа; люди, находящиеся в местах лишения свободы; люди, склонные к рискованным сексуальным практикам).




Лечить нужно:

при умеренном фиброзе (F2)



Лечение может быть отложено:

При отсутствии или при легкой форме фиброза (F0 – F1) и без наличия внепеченочных проявлений, указанных выше.



ЧТО из лечения доступно в РФ (2015):

Стандартные интерфероны («Роферон-А», «Интрон А», «Лаферон», «Реаферон ЕС», «Реальдирон», «Эберон», «Интераль», «Альтевир», «Альфарона» и другие) и рибавирин (RBV) для генотипов 2 и 3, молодой возраст (до 40 лет), отсутствие выраженного фиброза/цирроза печени, отсутствие сопутствующих заболеваний. Курс лечения 24–48 недель.

Пегилированные интерфероны (PegIFN- α) («Пегасис»; «ПегИнtron»; «ПегАльтевир»; «Альгерон») + рибавирин (RBV) для генотипов с 2 по 6, курс лечения 24–48 недель. Для 1 генотипа желательна терапия с противовирусными препаратами (ПППД).

Противовирусные препараты прямого действия (ПППД) с пегилированными интерферонами (PegIFN- α) и рибавирином (RBV):

- ✚ телапревир («Инсиво») курс 12 недель для 1 генотипа;
- ✚ боцепревир («Виктрелис») курс 24–44 недели для 1 генотипа;
- ✚ симепревир («Сориад») курс 12 недель для 1 генотипа

Курс лечения ПППД + пегилированные интерфероны (PegIFN- α) + рибавирин (RBV): от 24 до 48 недель


Комбинированный препарат омбитасвир, дасабувир и паритапревир/ритонавир («Викейра Пак») с рибавирином (RBV) или без рибавирина (RBV). Курс 12–24 недели для 1 и 4 генотипов.



Что из лечения гепатита С есть в мире на 2015 и что нас ждет в РФ:

- ✚ СОФОСБУВИР + рибавирин – курс 12–24 недели
- ✚ ДАКЛАТАСВИР + СОФОСБУВИР – курс 12–24 недели
- ✚ СОФОСБУВИР + ЛЕДИПАСВИР – 1 таблетка в день, курс 12–24 недели

Рекомендуемые схемы лечения смотри в таблице 1.



Что делать, если лечение гепатита С требуется сейчас:

ГЕНЕРИКИ (Индия, Китай, Египет, Непал, Марокко и др.) Средняя цена курса лечения генетическими препаратами:

- ✚ софосбувир + рибавирин – от \$1000
- ✚ софосбувир + пегилированные интерфероны + рибавирин от \$1785

таблица 1 Рекомендуемые схемы лечения гепатита С, доступные в мире (EASL 2015):

| Генотип ВГС | PegIFN- α , RBV, софосбувир | PegIFN- α , RBV, симепревир | Софосбувир и RBV | Софосбувир и ледипасвир | Паритапревир, бустированный ритонавиром, омбитасвир и дасабувир | Паритапревир, бустированный ритонавиром, и омбитасвир | Софосбувир и симепревир | Софосбувир и даклатаасвир |
|-------------|------------------------------------|--|------------------|-------------------------|---|---|-------------------------|---------------------------|
| 1a | 12 недель | 12 недель, затем PegIFN- α и RBV 12 недель (для наивных пациентов или с рецидивом) или 36 недель (в случаях нулевого или частичного вирусологического ответа) | Не рекомендуется | 8-12 недель без RBV | 12 недель с RBV | Не рекомендуется | 12 недель без RBV | 12 недель без RBV |
| 1b | | | | | 12 недель без RBV | | | |
| 2 | 12 недель | Не рекомендуется | 12 недель | Не рекомендуется | Не рекомендуется | Не рекомендуется | Не рекомендуется | 12 недель без RBV |
| 3 | 12 недель | Не рекомендуется | 24 недели | Не рекомендуется | Не рекомендуется | Не рекомендуется | Не рекомендуется | 12 недель без RBV |
| 4 | 12 недель | 12 недель, затем PegIFN- α и RBV 12 недель (для наивных пациентов или с рецидивом) или 36 недель (в случаях нулевого или частичного вирусологического ответа) | Не рекомендуется | 12 недель без RBV | Не рекомендуется | 12 недель с RBV | 12 недель без RBV | 12 недель без RBV |
| 5 или 6 | 12 недель | Не рекомендуется | Не рекомендуется | 12 недель без RBV | Не рекомендуется | Не рекомендуется | Не рекомендуется | 12 недель без RBV |