

Армения: данные по гепатиту С¹

Эпидемиология

Показатель	Значение	Источник информации
Распространенность	4%	Интервью с гепатологом Национальной клиники инфекционных заболеваний: https://www.youtube.com/watch?v=d556US-dyuE
Бремя заболевания (оценочные данные)	120 тысяч	Цифра получена, исходя из распространенности гепатита С и численности населения в Армении
Оценочная распространенность ВГС среди ЛЖВ	17,89%	На основании данных Центра СПИД (2014 год)
Оценочная распространенность ВГС среди ЛУИН	52,6%	Биоповеденческое исследование в Республике Армения, 2012 г.
Основные группы риска	Данные отсутствуют	-

Лечение гепатита С

Текущий стандарт лечения:	PEG-IFN/RBV
Стоимость лечения:	От 305 долларов за ампулу PEG-IFN
Национальная программа:	Сведения отсутствуют
Клинические протоколы:	Сведения отсутствуют
Донорские программы:	Сведения отсутствуют
Доступ к ПППД второго поколения:	Отсутствует или ограничен

Возможные направления работы по расширению доступа²:

- Актуализация проблемы ВГС в целом
- Актуализация проблемы отсутствия достоверной статистики
- Пилотные программы по тестированию и лечению
- Регистрация ПППД второго поколения и работа по достижению низких цен
- Национальные протоколы по лечению ВГС
- Инициация разработки национальной программы по профилактике и лечению ВГС (или вирусных гепатитов с отдельным фокусом на ВГС) с учетом потребностей уязвимых групп

¹ При подготовке документа использовались данные отчета «Гепатит С в странах Восточной Европы и Центральной Азии: эпидемия и ответные меры» Международного Альянса по ВИЧ/СПИДу в Украине и ИТРСги. Данные приведены на конец сентября 2015 года

² Список не является исчерпывающим