

Азербайджан: данные по гепатиту С¹

Эпидемиология

| Показатель | Значение | Источник информации |
|---|----------|--|
| Распространенность | 3,2% | Оценочное значение на основании численности населения и предоставленных оценок |
| Бремя заболевания (оценочные данные) | 300 800 | Главный гастроэнтеролог Азербайджана, 2013. По данным Минздрава, официальное количество зарегистрированных людей с гепатитом С в 2013-ом году - 181 человек. |
| Оценочная распространенность ВГС среди ЛЖВ | 58,8% | Страновая отчетность для ССГАООН о достигнутом прогрессе в осуществлении глобальных мер в ответ на СПИД, 2012-2013 |
| Оценочная распространенность ВГС среди ЛУИН | 62,8% | По данным респондента |
| Основные группы риска | ЛУИН | По данным респондента |

Лечение гепатита С

| | |
|----------------------------------|---|
| Текущий стандарт лечения: | PEG-IFN/RBV |
| Стоимость лечения: | От 205 долларов за ампулу PEG-IFN, от 2700 долларов за 12-ти недельный курс софосбувиром |
| Национальная программа: | Началась в 2015, включает лечение PEG-IFN/RBV; сведения об охвате и объеме финансирования отсутствуют |
| Клинические протоколы: | 2009 год, планируется обновление с включением ПППД |
| Донорские программы: | Сведения отсутствуют |
| Доступ к ПППД второго поколения: | Зарегистрирован генерик софосбувира |

Возможные направления работы по расширению доступа²:

- Расширение национальной программы по лечению ВГС с учетом потребностей уязвимых групп и включение представителей НПО в ее работу
- Включение ПППД второго поколения (софосбувир) в национальную программу
- Пересмотр протоколов лечения ВГС, в том числе с привлечением НПО
- Регистрация других ПППД второго поколения и работа по снижению цен на препараты

¹ При подготовке документа использовались данные отчета «Гепатит С в странах Восточной Европы и Центральной Азии: эпидемия и ответные меры» Международного Альянса по ВИЧ/СПИДу в Украине и ИТРСги. Данные приведены на конец сентября 2015 года

² Список не является исчерпывающим