

Беларусь: данные по гепатиту С¹

Эпидемиология

Показатель	Значение	Источник информации
Распространенность	2-3%	Оценочное значение на основании численности населения и данных, предоставленных Министерством здравоохранения
Бремя заболевания (оценочные данные)	250 тыс.	Данные Минздрава, 2015, Первый открытый форум по гепатиту; официальные данные – 47 000
Оценочная распространенность ВГС среди ЛЖВ	н/д	-
Оценочная распространенность ВГС среди ЛУИН	70-95%	По данным сектора наркологического мониторинга Республиканского научно-практического центра психического здоровья http://naviny.by/rubrics/society/2013/07/25/ic_news_116_421694/
Основные группы риска	ЛУИН	По данным респондента

Лечение гепатита С

Текущий стандарт лечения:	PEG-IFN/RBV
Стоимость лечения:	От 86 долларов за ампулу PEG-IFN
Национальная программа:	Лицам до 18 лет лечение предоставляется бесплатно
Клинические протоколы:	2006 год
Донорские программы:	Сведения отсутствуют
Доступ к ПППД второго поколения:	Отсутствует или ограничен

Возможные направления работы по расширению доступа²:

- Актуализация проблемы ВГС в целом
- Инициация разработки национальной программы по профилактике и лечению вирусных гепатитов (с фокусом на ВГС) с учетом потребностей уязвимых групп с вовлечением НПО
- Пересмотр протоколов по лечению ВГС с вовлечением НПО
- Регистрация ПППД второго поколения и работа по снижению цен на препараты
- Устранение патентных барьеров (при необходимости).

¹ При подготовке документа использовались данные отчета «Гепатит С в странах Восточной Европы и Центральной Азии: эпидемия и ответные меры» Международного Альянса по ВИЧ/СПИДу в Украине и ИТРСги. Данные приведены на конец сентября 2015 года

² Список не является исчерпывающим