

Молдова: данные по гепатиту С¹

Эпидемиология

Показатель	Значение	Источник информации
Распространенность	1,7-4%	По данным респондентов
Бремя заболевания (оценочные данные)	60-142 тыс.	Национальный центр управления здравоохранением, 2012 г., официальная статистика – 9411 человек
Оценочная распространенность ВГС среди ЛЖВ	45,6%	По данным респондентов
Оценочная распространенность ВГС среди ЛУИН	35,3-65,4%	Интегрированное биоповеденческое исследование за 2012 год проводилось на 4 сайтах; выборка формировалась самими респондентами
Основные группы риска	ЛУИН	По данным респондентов

Лечение гепатита С

Текущий стандарт лечения:	PEG-IFN/RBV
Стоимость лечения:	Зарегистрирована цена от 95 долларов за ампулу PEG-IFN
Национальная программа:	Есть, охват – около 300 пациентов в год, но точные данные недоступны.
Клинические протоколы:	2012 год
Донорские программы:	Сведения отсутствуют
Доступ к ПППД второго поколения:	Отсутствует или ограничен

Возможные направления работы по расширению доступа²:

- Расширение национальной программы лечения
- Регистрация новых ПППД
- Пересмотр национальных протоколов по лечению ВГС
- Включение ПППД в национальную программу лечения
- Работа над снижением цен на препараты
- Устранение патентных барьеров для улучшения доступа к препаратам (при необходимости)

¹ При подготовке документа использовались данные отчета «Гепатит С в странах Восточной Европы и Центральной Азии: эпидемия и ответные меры» Международного Альянса по ВИЧ/СПИДу в Украине и ИТРСги. Данные приведены на конец сентября 2015 года

² Список не является исчерпывающим