

Таджикистан: данные по гепатиту С¹

Эпидемиология

Показатель	Значение	Источник информации
Распространенность	3,8%	Нет официальных данных, взята оценочная распространенность по Средней Азии
Бремя заболевания (оценочные данные)	320 тыс.	Нет официальных данных, взята оценочная распространенность по Средней Азии
Оценочная распространенность ВГС среди ЛЖВ	25,6%	Дозорный эпидемиологический надзор 2014; выборка 2200 ЛУИН; данные относятся только к ВИЧ+ЛУИН
Оценочная распространенность ВГС среди ЛУИН	22,7-49,3%	Нижняя оценка – там же. 49,3% - исследование, проведенное «СПИН ПЛЮС», выборка – 300 ЛУИН.
Основные группы риска	ЛУИН	По данным респондентов

Лечение гепатита С

Текущий стандарт лечения:	PEG-IFN/RBV
Стоимость лечения:	От 200 долларов за ампулу PEG-IFN (включая RBV)
Национальная программа:	Сведения отсутствуют
Клинические протоколы:	Используются российские протоколы 2014 года
Донорские программы:	Сведения отсутствуют
Доступ к ПППД второго поколения:	Отсутствует или ограничен, страна включена в программы доступа компаний Gilead и BMS

Возможные направления работы по расширению доступа²:

- Актуализация проблемы ВГС в целом и отсутствия достоверной статистики
- Пилотные программы по диагностике и лечению ВГС
- Инициация дискуссий по разработке и принятию национальной программы по профилактике и лечению вирусных гепатитов (с фокусом на ВГС)
- Регистрация новых ПППД (в том числе в рамках существующих лицензионных соглашений)
- Снижение цен на препараты

¹ При подготовке документа использовались данные отчета «Гепатит С в странах Восточной Европы и Центральной Азии: эпидемия и ответные меры» Международного Альянса по ВИЧ/СПИДу в Украине и ИТРСги. Данные приведены на конец сентября 2015 года

² Список не является исчерпывающим