

Узбекистан: данные по гепатиту С¹

Эпидемиология

Показатель	Значение	Источник информации
Распространенность	6,5%	Нет официальных данных, цифра приведена в исследовании Эндрю Хилла, Hill A, Khoo S, Fortunak J, et al. Minimum costs for producing hepatitis C direct-acting antivirals for use in largescale treatment access programs in developing countries. Clin Infect Dis. 2014 Apr;58(7):928-36. doi: 10.1093/cid/ciu012
Бремя заболевания (оценочные данные)	1,8 млн.	Оценочное значение на основании численности населения и распространенности ВГС
Оценочная распространенность ВГС среди ЛЖВ	н/д	-
Оценочная распространенность ВГС среди ЛУИН	36%	Дозорный эпидемиологический надзор 2007
Основные группы риска	Медработники, ЛУИН, пациенты, проходящие инвазивные процедуры	По данным респондентов

Лечение гепатита С

Текущий стандарт лечения:	PEG-IFN + RBV
Стоимость лечения:	От 280 долларов за ампулу PEG-IFN
Национальная программа:	Сведения отсутствуют
Клинические протоколы:	2013 год
Донорские программы:	Сведения отсутствуют
Доступ к ПППД второго поколения:	Отсутствует или ограничен, страна включена в программы доступа компаний Gilead и BMS

Возможные направления работы по расширению доступа:

- Актуализация проблемы ВГС в целом
- Пилотные программы по диагностике и лечению ВГС
- Инициация дискуссий по разработке и принятию национальной программы по профилактике и лечению вирусных гепатитов (с фокусом на ВГС)
- Регистрация ПППД (в том числе в рамках заключенных лицензионных соглашений) и снижение цен на них
- Пересмотр национальных протоколов по лечению ВГС

¹ При подготовке документа использовались данные отчета «Гепатит С в странах Восточной Европы и Центральной Азии: эпидемия и ответные меры» Международного Альянса по ВИЧ/СПИДу в Украине и ИТРСги. Данные приведены на конец сентября 2015 года